

- ※ 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- ※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- ※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

사용설명서  현대약품은 제약업계 최초로 CCM 인증 기업으로서 소비자 중심 경영을 실천합니다.	기침감기 증상에 꼭 맞춘 처방 시노코프 캡슐 [®]	분류번호 222
		일반의약품 KGMP

시노코프캡슐은 수축한 기관지를 확장시켜주는 디프로필린과 d-메틸에페드린염산염 및 기침의 중추에 작용하여 기침의 발생을 억제하는 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물을 함유하는 진해(기침을 그치게 함)거담제(7래약)로 기침, 가래에 뛰어난 효과를 나타냅니다. 또한 항히스타민제인 디펜히드라민염산염을 함유하므로 알레르기성 천식, 기침에도 뛰어난 효과가 있습니다.

[원료약품 및 그분량] 1캡슐 중

디프로필린(USP)	37.5mg
d-메틸에페드린염산염(KP)	3.1mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP) 비고 : 일수화물	10.0mg
디펜히드라민염산염(KP)	7.5mg
첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호	
동물유래성분 : 유당(소의젖), 스테아르산마그네슘(소의 우지)	

[성상] 백색 분말이 든 상부 연녹색, 하부 백색의 볼투명 경질캡슐제

[효능·효과] 기침, 가래

[용법·용량] 연령(나이)에 따라 다음 용량을 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.

- 만 15세 이상 : 1회 2캡슐
- 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1캡슐
- (단, 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만은 1일 4회 복용한다.)
- 만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) 수유부(수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것.)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(7래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구(복용)제, 알미약, 알레르기용약), 진정제, 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기)·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기)·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 놓)곤란, 간질 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 놓)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 동계(두근거림), 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 3) 만 7세 이하의 영아(갓난아기)·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 10캡슐

[저장단위] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

- ※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(출혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문은의 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- ※ 이 사용설명서 개정년월(2015년 07월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 오른쪽 그림과 같이 캡슐이 들어있는 PTP시트의 ㄱ부 분을 손가락으로 강하게 눌러서 뒷면의 알루미늄을 터뜨려 꺼내어 드십시오.(그대로 드시면 식도 점막을 자극하여 사고로 이어질 수 있습니다.)



제조사 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

☎ 제품문의처 : 1666-9979
사용설명서 개정년월 : 2015.07

