

디자인 앤드	품목명	품목번호	버전
	코파원시럽 설명서		230505
규격	가로 : 110mm 세로 : 230mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 6pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법 행간 : 7pt		
색상	Pantone485, Pantone Black(검정)		
지중 / 코팅	70g 모조지 또는 성형하는 지중		
후가공	없음		
비고			



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

코파원시럽

한외마약

사용설명서
전문의약품
KGMP

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

■ 유효성분

디하드로코데인아트라트산염(USP)	50mg
디-메틸에피드린염산염(KP)	131mg
클로로페니리아민말레산염(KP)	15mg
염화암모늄(USP)	1000mg

■ 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 8mg
파라옥시벤조산프로필 2mg

■ 첨가제(다른색소) : 적색40호

■ 기타 첨가제 : 밀크크림바닐라향51242, 수크랄로스, 시트르산나트륨수화물, 시트르산수화물, 정제수, 체리후레바, D-소르비톨액

【성상】 얇은 빨강색의 방향성 시럽제

【효능·효과】 기침, 기래

【용법·용량】

다음 용량을 1일 3 ~ 4회 식후 및 취침 시 경구투여한다.

성인 및 15세 이상 청소년 : 1회 20 mL

소아 : 1회

12세 이상 ~ 15세 미만 13 mL

【사용상의 주의사항】

1. 경고

증증의 호흡 억제 위험이 증가할 수 있으니 18세 미만의 비만, 폐색성 수면 무호흡증후군 또는 중증 폐 질환을 가진 환자에게 투여를 피한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- MAO억제제(항우울제, 정신병치료제, 강정조절제, 항파킨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 환자
- 12세 미만의 소아(소아에 대한 투여 항 참조)

4. 수유부

- 녹내장 환자(항콜린 작용에 의해 안압이 상승되어 녹내장이 악화될 수 있다)
- 전립선비대 등 하부요로폐색성 질환 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 분인, 임신 또는 향제 등이 두드러기, 접촉피부염, 알레르기비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예, 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 사람

- 간장애, 신장애, 갑상샘질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 허약자 또는 고열이 있는 사람

- 순환기계 질환, 고혈압 등 신체로 친환경 환자 또는 고령자

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

- 인압상승 또는 배뇨장애 환자

- 의사의 치료를 받고 있는 사람

- 다음과 같은 기침이 있는 사람

- 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기증, 기관지확장증, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

- 협착성소화성궤양 또는 유문십이지장 폐색 환자(클로로페니리아민의 항콜린 작용에 의해 평활근의 운동억제, 긴장저하가 일어나 증상이 악화될 수 있다)

- 노전증 환자

4. 이상반응

- 소코 : 청색증, 호흡곤란, 흉부불쾌감, 혈압저하 등

- 과민반응 : 발진, 발적, 가려움, 광민반응, 박탈피부염, 두드러기, 단일수축, 근하약, 협조불능
- 소화기계 : 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 구강지속적이거나 심한, 가슴쓰림, 소화불량, 복통, 설사
- 정신신경계 : 어지럼, 불안, 떨림, 불면, 졸음, 진정, 신경과민, 두통, 초조감, 복시, 이명, 전정장애, 이상황홀감, 정서불안, 히스테리, 진정, 신경염, 혼조상, 감각이상, 흐린시력, 집중력감소, 권태감, 경련, 척란
- 비뇨기계 : 배뇨곤란, 빙뇨, 요폐, 요저류

- 순환기계 : 저혈압, 심박항진, 빙백, 부정맥, 기와수축, 간염, 황달

- 호흡기계 : 코 또는 기도의 건조, 기관분비액의 점성화, 천명, 코막힘

- 혈액계 : 용혈성빈혈, 혈소판감소, 재생불량성빈혈, 무괴립구증

- 기타 : 오한, 발한이상, 흉통, 피로감, 월경이상

5. 일반적 주의

- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피한다.
- 고령투여 하거나 장기연용하지 않는다.

6. 상호작용

- 다른 약들과 병용투여하지 않는다 : 다른 진해기당제, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등
- 알코올, 중추신경억제제 병용시 졸음을 유발할 수 있다.

- 클로로페니리아민은 페니토인대사를 억제하여 페니토인 독성을 유발할 수 있다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여한다.
- 2) 이 약이 유즙 분비를 억제하고 모유로 이행될 수 있으므로 수유부에게 투여하지 않는다.

8. 소아에 대한 투여

- 소아에 고령 투여하면 환각, 흥분, 경련, 사망을 일으킬 수 있으니 특히 주의한다.
- 중증 호흡억제가 나타날 수 있으니 12세 미만 소아에게 투여하지 말아야 한다(12세 미만 소아는 호흡억제 감수성이 크다. 12세 미만 소아에서 사망을 포함하는 중증 호흡억제 위험이 크다는 국외 보고가 있다).

9. 고령자에 대한 투여

- 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여해야 한다.

10. 과량투여시의 처치

- 클로로페니리아민의 치사량은 체중 kg당 25 ~ 50 mg이다. 증상으로는 진정, 중추신경계 비정상적 자극, 중독성 정신병, 경련, 무호흡, 정신착란, 항콜린 효과, 실조증, 부정맥을 비롯한 심혈관계 혀탈증 등이 나타날 수 있으며 이 때에는 토근시럽을 이용해 구토를 유발시키거나 위세척을 한다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 도도록 습기기 적은 서늘한 곳에 밀접하여 보관한다.
- 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 20mL / 포×20

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 오용을 막고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 이 약을 투여함으로서 알레르기 증상(발진, 가려움이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오).

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품 문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일(2023년 05월 10일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎14-3330, 1644-6223)

제조의뢰자 : 현대약품(주)

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제조자 : (주)제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245

♣ 제품문의처 : ☎ 1666-9979

♣ 사용설명서 개정연월일 : 2023. 05. 10

