

디자인 앤 드	품목명 누보클렌액 50mL 설명서(위탁생산)	품목번호 220902	버전
규격	가로 : 150mm 세로 : 210mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색상	DIC222 DIC582(백)		
지중 / 코팅	70g 모조지 또는 상용하는 지중		
후가공	없음		
비고			



소비자 중심
ccm
소비자 중심
Since 2009

한국제약은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

살균 · 소독 · 빠른 상처회복에

누보클렌 액

사용설명서
일반의약품
KGMP

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

■ 유효성분

클로르헥시딘글루코산염(액)(EP) 1.0mL
(클로르헥시딘글루코산염으로 0.2g 해당량)
디펜하이드라민염산염(USP) 0.3g
디부카인염산염(USP) 0.1g
알란토인(USP) 0.2g
나파졸린염산염(USP) 0.1g
■ 기타 첨가제 : 노녹사나모, 시트르산수화물, 시트르산나트륨수화물, 에탄올, 정제수, 폴리에틸렌글리콜 400

[성상] 무색의 투명한 액체이다

[효능·효과]

- 긁힌 상처, 베인 상처, 칭상(상처)
- 손·손기름의 살균·소독
- 치질인 경우의 항문 살균·소독

[용법·용량]

1일 1~수회(여러 차례) 적당량을 환부(질환 부위)에 바른다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람 또는 부위에 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 클로르헥시딘 제제에過민반응 환자
- 2) 뇌, 척수, 귀(내이)(속 귀), 종이(기관내 귀), 외이(바깥 귀)(청각신경 또는 중추신경에 직접 사용할 경우 난청, 신경장애를 일으킬 수 있다)
- 3) 질, 방광, 구강(입안) 등의 점막면(쇼크가 나타났다는 보고가 있으며 초기증상으로는 구역, 불쾌감, 식은땀, 어지럼, 답답함, 호흡곤란, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 있다)
- 4) 눈
- 5) 미란(짓무름) 또는 화농성인(붉은) 환부(질환 부위)

2. 다음과 같은 사람 또는 부위에 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 미란(짓무름)) 등이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 4) 환부(질환 부위)가 광범위한 사람
- 5) 상처가 심하거나 화상이 심한 사람
- 6) 분만 직전의 외음부 주위(신생아의 눈 등에 들어가 악영향을 미칠 수 있다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소크 : 드물게 소크증상이 일어날 수 있으므로 충분히 관찰하고 구역, 불쾌감, 식은땀, 답답함, 호흡곤란, 발작 등의 증상이 나타나는 경우
- 2) 과민반응 : 때때로 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 두드러기, 가려움, 부종(부기) 등의 과민증상이 나타날 경우

제조의뢰자 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55
제조자 : 주식회사파스
충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47



현대약품(주)

◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
사용설명서 개정연월일: 2022. 09. 30
220902