

디자인앤드	품 목 명		버전
	리나치올시럽2%라벨/500ML	품목번호	
규 격	가로:190mm 세로:90mm		
인 쇄 규 격	가로:50mm 세로:20mm 분리배출/바코드 8mm		
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC26 DIC582(떡)		
지종 / 코팅	아트지 / 기계코팅(불변) 또는 상응		
후 가 공	없음		
비 고			

- 이 약을 사용하기 전에 제품라벨에 기재된 사항을 자세히 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

- 유효성분 : 카르보시스테인(KP) 2g
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g
- 기타 첨가제 : 라즈베리향, 바닐린, 백당, 수산화나트륨, 정제수, 체리향, 카라멜색소분말

【성 상】 적갈색의 시럽제

【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 객담(가래)배출고관 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염
2. 만성부비동염의 배농(고름 빠기), 삼출성중이(기온데귀)염의 배액

【용법·용량】

- 6세 이상 ~ 12세 이하 : 카르보시스테인으로서 1회 250mg 1일 3회 복용한다.
 2세 이상 ~ 5세 이하 : 이 약으로서 1일 250 ~ 500mg을 4회로 분할 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 위·십이지장 궤양 환자
- 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 3) 2세 미만 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 간장애 환자
 - 2) 심장예 환자
 - 3) 위·십이지장 궤양의 병력이 있는 환자
 - 4) 일부 : 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 특히 임신 3개월 이내에는 투여가 권장되지 않는다.
 - 5) 수유부 : 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 6) 고령자 : 일반적으로 고령자노인은 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
 - 7) 이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

급·만성기관지염

일반의약품

리나치올[®]

(카르보시스테인) 시럽

유·소아용 500mL 2% ccm



- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 복부(배부)팽만감, 위장관출혈, 가슴쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈(목마름) 등, 민감한 환자에서 구내염(입안염)
- 2) 과민반응 : 때때로 발진, 홍반(붉은 반점), 습진 등
- 3) 신경계 : 드물게 두통, 4) 호흡기계 : 민감한 환자에서 비염(코염)
- 5) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 콧물, 전신의 압박감
- 6) 피부점막(안정유근)스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사증(리델증후군)
- 7) AST, ALT, ALP, LDH 상승 등을 동반한 간기능장애, 황달
- 8) 소크 아레발락시모양 반응 9) 14일 이상 기침이 계속되는 경우
4. 기타 이 약을 복용시 주의사항
 - 1) 과량 복용시 위세척이 유익하며, 위장장애가 가장 흔한 증상이다.
 - 2) 항생물질과 트리메토클놀림연염을 함유하는 시럽제와의 혼합에서는 인관색, 탁함, 냄새 등의 변화가 일어날 수 있으므로 이들 약과의 병용(함께 복용)을 필요로 할 경우에는 따로따로 복용한다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉뚜껑을 꼭 단아하여 보관할 것.
 - 3) 약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생시 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.



* 새워서 보관하세요! 눅눅해서 보관할 경우 액이 흘러 내릴 수 있습니다.

210104

【저장방법】 기밀용기, 실온 보관 **【포장단위】** 500mL/병, 1000mL/병
 * 리나치올시럽은 공기와 접촉시 유효성분인 카르보시스테인의 결정이 생길 수 있으니 사용 후 뚜껑을 꼭 단아 주십시오
 * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
 * 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈)되어 붉어짐, 가려움)이나 타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 * 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
 * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 * 이 제품의 내용에 대한 문안은 구입처나 제품라벨에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
 * 제품기재사항 개정연월일(2021년 02월 24일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>) 나 제품문의처 ☎ 1666-9979에서 확인할 수 있습니다.
 * 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물관리(전)관리원 ☎ 14-3330, 1644-6223
 * 제품문의처 : ☎ 1666-9979
 * 제품기재사항 개정연월일 : 2021.02.24
제조자 : (주)제뉴원사이언스
 세종특별자치시 천의면 산단길 245
제조의뢰자 : 현대약품(주)
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 천다리길 55 (01)08806420002127



플라스틱
HDPE
뚜껑:PP
속뚜껑:LDPE



제조번호 :

사용기한 :