

디자인 로드	품 목 명	품목번호	버전
	이바프텐액 / 설명서		210700
규 격	가로 : 110mm 세로 : 230mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	PANTONE 246C, 먹		
지 종 / 코팅			
후 가 공			
비 고			



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

입이 아플땐!

이바프텐액

(벤지다민염산염)

사용설명서
일반의약품
KGMP

- 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1포 중

- 유효성분 : 벤지다민염산염(KP) 22.50mg
- 첨가제(보조제) : 파라옥시벤조산메틸 1.50mg
- 기타 첨가제 : 박하유, 시트르산, 인산알루미늄수소칼륨, 정제수, 토크페롤폴리에틸렌글리콜숙시네이트, D-스orbitol, L-멘톨

[성 성] 박하향의 무색 투명한 가글제이다.

[효능·효과]

1.주효능 효과

다음 질환에 의한 염증의 완화 : 치은염(잇몸염), 구내염(입안염), 아구창, 발치전·후, 인두염, 편도염, 방사선요법 및 삼관법 등의 물리적 원인에 의한 구강입안점막염

[용법·용량]

- 1회 15ml 1일 2~3회 원액 그대로 또는 소량의 물로 희석하여 양치질한다.
- 의사의 지도감독없이 7일 이상 연속투여하지 않는다.
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약에 과민증 환자

3. 부작용

- 1) 구강(입안) : 때때로 구강(입안)마비감, 자상감(刺傷感), 작열감(灼熱感)이 경미하게 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 드물게 과민반응이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 트림, 구역, 구토가 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 이 약을 삼킨 후 드물게 수면장애, 시각적 환각(세동(진떨림), 색체에 대한 환각), 두드러기, 발진, 광과민증이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

양치질 후 삼키지 말고 뱉어낸다.

5. 소아에 대한 투여

이 약은 12세 이하의 소아에게는 적합하지 않다.

6. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

[포장단위] 10포/상자 (15mL/포 X 10)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입된 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- ※ 이 사용설명서 작성연월일(2021년 06월 29일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎ 1644-6223, 14-3330)

제조사 : (주)제뉴원사이언스
 세종특별자치시 전의면 산단길 245
 제조의뢰자 : 현대약품(주)
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

☎ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
 사용설명서 작성연월일 : 2021. 06. 29

